

Buchsbaumzünsler



Taxonomie:

Reich: Tierreich / Animalia

Klasse: Insekt / Insecta

Ordnung: Schmetterlinge / Lepidoptera

Familie: Crambidae

Gattung: *Cydalis*

Art: *C. perspectalis*



Morphologie:

Raupe:

- Länge: ca. 5 cm
- Farbe: gelbgrün bis dunkelgrün sowie schwarz und weiß gestreift mit schwarzen Punkten

Falter:

- Flügelspannweite: 40 – 45 mm
- Vorderflügel sind seidig weiß gefärbt mit breitem braunen Band am Vorderrand sowie am Saum versehen
- Im Mittelfeld ist eine kleine braun gefärbte Ausbuchtung sowie halbmondiger weißer Fleck

Entwicklung:

- Holometabole Verwandlung (Ei, Larve, Puppe, adultes Tier)
- Weibchen legen die Eier gezielt an Buchsbäume
- Nach ca. 3 Tagen schlüpfen die Raupen
- Nach dem Durchlaufen der Larvenstadien verpuppen sich die Raupen, werden ca. nach einer Woche zum Falter.
- Ein Falter legt ca. 150 blassgelbe, linsenförmige Eier ab

Lebensweise:

Die Falter sitzen vornehmlich an der Blattunterseite, der Falter lebt ca. 9 Tage, Raupen überwintern in der Pflanze, Raupen fressen zuerst die Blätter anschließend die grüne Zweigrinde

Merkmale:

- Mittlerweile auch in ganz Europa verbreitet
- Raupe verursacht Schäden durch Kahlfraß an Buchsbäumen