

Dickmaulrüssler



Taxonomie:

Reich: Tierreich / Animalia

Stamm: Gliederfüßer / Arthropoda

Klasse: Insekt / Insecta

Ordnung: Käfer / Coleoptera

Familie: Rüsselkäfer / Curculionidae

Gattung: Dickmaulrüssler

Art: Otiorhynchus

Foto 1: gailhampshire from Cradley,
Malvern, U.K

([https://commons.wikimedia.org/wiki/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otiorhynchus_clavipes_(35561192511).jpg)

[File:Otiorhynchus_clavipes_?](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otiorhynchus_clavipes_(35561192511).jpg)

[_\(35561192511\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otiorhynchus_clavipes_(35561192511).jpg)), „Otiorhynchus
clavipes ? (35561192511)“,

[https://creativecommons.org/licenses/](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)
[by/2.0/legalcode](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)

Morphologie:

- Größe: 3 – 14 mm
- Farbe: braun – schwarz
- 6 Beine
- Kann nicht fliegen
- Weist auf der Vorderseite einen Rüssel auf

Entwicklung:

- Holometabole Verwandlung (Ei, Larve, Puppe, adultes Tier)
- Eiablage erfolgt in den Boden – bis zu 1000 Stück pro Käfer
- Larven fressen die Wurzeln an
- Zwischen April und Mai erfolgt die Verpuppung
- Nach etwa 3 Wochen schlüpfen die Käfer

Lebensweise:

Die erwachsenen Tiere treten meist zur Dämmerung oder nachts auf, sind an krautigen Pflanzen oder kleineren Gehölzen von April bis Oktober zu finden, die Larven fressen die Wurzeln, der Käfer frisst die Blätter

Merkmale:

- Blätter sind vom Rand her in Form eines Halbkreises angefressen
- Tagsüber versteckt sich der Käfer
- Sind Allesfresser
- Lassen sich bei Gefahr auf den Boden fallen